



Zoom espèce



Tous les mois, la Réserve Naturelle des marais de Bruges vous présente une nouvelle espèce.



À la découverte de la ... Fauvette à tête noire

La Fauvette à tête noire est un passereau de petite taille, environ 14cm de longueur. Le mâle se reconnaît très bien grâce à sa calotte noire présente sur la tête, contrastant avec le reste de son plumage grisâtre. La femelle possède également une calotte mais de couleur brune, permettant aisément de la distinguer à l'âge adulte du mâle. Cette fauvette de la famille des Sylviidés, possède un chant assez complexe avec une mélodie flûtée et puissante, souvent très grinçante au démarrage. Ce passereau peut s'observer partout en France métropolitaine. Il affectionne une très grande variabilité de milieux, avec une préférence pour les zones buissonnantes et bocagères. Buissons ou arbustes dans lesquelles l'espèce fait son nid, avec 4 ou 5 oeufs par couvée, répétée deux fois par an. Les oeufs éclosent au bout de deux semaines environ et les jeunes quittent le nid entre 9 et 14 jours.

● Un régime alimentaire variant selon la saison !

L'hiver, la Fauvette à tête noire va se nourrir de baies de lierre, de gui et autres baies disponibles à cette saison, elle peut ponctuellement se nourrir de certaines petites graines. Lorsque les beaux jours arrivent, ainsi qu'avec les jeunes à nourrir, cette fauvette va s'alimenter majoritairement d'une grande diversité d'insectes adultes ou au stade de larve : scarabées, mouches, abeilles ou guêpes, fourmis, même des araignées ou des lombrics peuvent y passer. Elle va manger des fruits comme les mûres, framboises, cerises, ou même les baies de sureau, troène etc. L'espèce participe donc dans la chaîne alimentaire de diverses manières, et contribue à la dissémination des graines de plantes à baies ou fruits.

● Un oiseau très commun, qu'une partie de l'année

La Fauvette à tête noire s'observe par chez nous majoritairement de début mars à fin septembre. Quelques individus peuvent cependant stationner en Gironde, afin d'y passer l'hiver. En général, ce sont des individus, le plus souvent des mâles, venant du Nord et de l'Est. Ceux présents chez nous du printemps à l'été vont migrer vers l'Afrique de l'Ouest, certains se contentant de s'arrêter en péninsule ibérique. La migration de cette espèce se déroule la nuit, de fin août à début octobre pour la migration post-nuptiale, et de début mars à mi-avril pour la migration pré-nuptiale. Certains individus ne migrent pas du tout ou peu, et passent toute l'année au même endroit. Pour cet oiseau, on parle alors d'espèce migratrice partielle.



#62